arXiv:1601.02558v1 [math-ph] 13 Dec 2015

УДК 517.98

Трансляционно-инвариантные и слабо периодические меры Гиббса для HC-моделей на дереве Кэли

Р.М.Хакимов[1]

В данной статье изучаются Hard-Core (HC) модели на дереве Кэли. Для HC-модели с двумя состояниями улучшен один из результатов из работы [9]: доказано, что при некоторых условиях на параметры существуют ровно две слабо периодические (не периодические) меры Гиббса. Кроме того, рассмотрены плодородные HC-модели с параметром активности $\lambda > 0$ и четырьмя состояниями. Известно, что существуют три типа таких моделей. Обобщены некоторые результаты из работы [16] и для одной из моделей доказана не единственность трансляционно-инвариантной меры Гиббса.

Ключевые слова: дерево Кэли, конфигурация, HC-модель, плодородный граф, мера Гиббса, слабо периодические меры, трансляционно-инвариантные меры.

1 Введение.

Понятие меры Гиббса играет важную роль при изучении состояний физической системы, т.е. если мера Гиббса не единственна, то говорят, что существует фазовый переход, а это происходит, когда физическая система меняет свое состояние при изменении температуры ([1]). Определение меры Гиббса и других понятий, связанных с теорией мер Гиббса, можно найти, например, в работах ([1]-[4]).

HC-модель на d-мерной решетке $\mathbb{Z}^d$ была введена и изучена Мазелью и Суховым в работе [5]. Работы ([6]-[9]) посвящены к изучению мер Гиббса для HC-модели с двумя состояниями на дереве Кэли. В работе ([6]) была доказана единственность трансляционно-инвариантной меры. В работе [7] изучены слабо периодические меры Гиббса для HC-модели для нормального делителя индекса два и при некоторых условиях на параметры показана единственность (трансляционно-инвариантность) слабо периодической меры Гиббса, а в работе [8] показана единственность (трансляционно-инвариантность) слабо периодической меры Гиббса для HC-модели при любых значениях параметров. В [9] доказывается существование слабо периодических (не периодических) мер Гиббса для HC-модели для нормального делителя индекса четыре на некоторых инвариантах при некоторых условиях на параметры.

В работах ([10]-[13]) изучены гиббсовские меры для HC-моделей с тремя состояниями на дереве Кэли порядка $k \geq 1$ и доказано, что трансляционно-инвариантная мера Гиббса не единственна. В работе [14] выделены плодородные HC-модели, соответствующие графам "петля", "свисток", "жезл" и "ключ" в случае трех состояний, и "палка", "ключ" и "пистолет" в случае четырех состояний. В работе [15] рассмотрены плодородные HC-модели с

[1]Институт математики, ул. Дурмон йули, 29, Ташкент, 100125, Узбекистан.
E-mail: rustam-7102@rambler.ru

четырьмя состояниями на дереве Кэли порядка два и в случаях "палка", "ключ" и "пистолет" доказана единственность трансляционно-инвариантной меры Гиббса, а в [16] эта задача изучена на дереве Кэли порядка два, три, четыре и пять. В случае "палка" найдены такие критические значения параметра λ, что трансляционно-инвариантная мера не единственна.

Настоящая работа посвящена изучению слабо периодических мер Гиббса для НС-модели с двумя состояниями для нормального делителя индекса четыре и изучению трансляционно-инвариантных мер Гиббса для плодородных НС-моделей с четырьмя состояниями, соответствующих графам "палка" и "ключ" на дереве Кэли. В первом случае доказывается, что на некотором инвариантном множестве существуют *ровно* две слабо периодические меры Гиббса, отличные от периодических. Во втором случае обобщается один из результатов работы [16] в случае "палка". Кроме того, показана не единственность трансляционно-инвариантной меры Гиббса на дереве Кэли порядка $k \geq 4$ в случае "ключ" и даны точные критические значения для параметра λ.

2 Предварительные сведения.

Дерево Кэли τ^k порядка $k \geq 1$ - бесконечное дерево, т.е. граф без циклов, из каждой вершины которого выходит ровно $k+1$ ребер. Пусть $\tau^k = (V, L, i)$, где V — есть множество вершин τ^k, L — его множество ребер и i — функция инцидентности, сопоставляющая каждому ребру $l \in L$ его концевые точки $x, y \in V$. Если $i(l) = \{x, y\}$, то x и y называются *ближайшими соседями вершины* и обозначается $l = \langle x, y\rangle$. Расстояние $d(x, y), x, y \in V$ на дереве Кэли определяется формулой

$$d(x,y) = \min\{d | \exists x = x_0, x_1, \ldots, x_{d-1}, x_d = y \in V \text{ такие, что } \langle x_0, x_1\rangle, \ldots, \langle x_{d-1}, x_d\rangle\}.$$

Для фиксированного $x^0 \in V$ обозначим $W_n = \{x \in V |\ d(x, x^0) = n\}$, $V_n = \{x \in V |\ d(x, x^0) \leq n\}$. Для $x \in W_n$ обозначим $S(x) = \{y \in W_{n+1} : d(x, y) = 1\}$.

Известно, что существует взаимнооднозначное соответствие между множеством V вершин дерева Кэли порядка $k \geq 1$ и группой G_k, являющейся свободным произведением $k+1$ циклических групп второго порядка с образующими $a_1, ..., a_{k+1}$, соответственно (см. [17]).

Рассмотрим НС-модель ближайших соседей с $m-$состояниями на дереве Кэли. В этой модели каждой вершине x ставится в соответствие одно из значений $\sigma(x) \in \Phi = \{0, 1, .., m\}$. Значения $\sigma(x) = 1, .., m$ означают, что вершина x 'занята', а значение $\sigma(x) = 0$ означает, что вершина x 'вакантна'.

Конфигурация $\sigma = \{\sigma(x),\ x \in V\}$ на дереве Кэли задается как функция из V в Φ. Множество всех конфигураций на V обозначается через Ω. Аналогичном образом можно определить конфигурации в V_n (W_n), и множество всех конфигураций в V_n (W_n) обозначается как Ω_{V_n} (Ω_{W_n}).

Рассмотрим множество Φ как множество вершин некоторого графа G. С помощью графа G определим $G-$допустимую конфигурацию следующим образом. Конфигурация σ называется *G-допустимой конфигурацией* на дереве Кэли (в V_n или W_n), если $\{\sigma(x), \sigma(y)\}$-ребро

графа G для любой ближайшей пары соседей x, y из V (из V_n). Обозначим множество G-допустимых конфигураций через Ω^G ($\Omega^G_{V_n}$).

Множество активности [14] для графа G есть функция $l : G \to R_+$ из множества G во множество положительных действительных чисел. Значение l_i функции l в вершине $i \in \{0, 1, .., m\}$ называется ее "активностью".

Для данных G и l определим гамильтониан $G-$HC-модели как

$$H^{\lambda}_G(\sigma) = \begin{cases} \sum\limits_{x \in V} \log \lambda_{\sigma(x)}, & \text{если } \sigma \in \Omega^G, \\ +\infty, & \text{если } \sigma \notin \Omega^G. \end{cases}$$

Определение 1.([14]) Граф называется плодородным, если существует набор активности λ такой, что соответствующий гамильтониан имеет не менее двух трансляционно-инвариантных мер Гиббса.

В этой работе рассматриваются случаи $m = 1$ и $m = 3$. При $m = 3$ рассмотрим случай $\lambda_0 = 1,\ \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = \lambda$ и изучим соответствующие этому случаю трансляционно-инвариантные меры Гиббса, а при $m = 1$ изучим слабо периодические меры Гиббса.

Для HC-модели с четырьмя состояниями рассмотрим два типа плодородных (fertile) графов с четырьмя вершинами $0, 1, 2, 3$ (на множестве значений $\sigma(x)$), которые имеют следующие виды (см.[14]-[16]):

$$\begin{aligned} &\textit{палка}: \quad \{0,1\},\{1,2\},\{2,3\}; \\ &\textit{ключ}: \quad \{0,1\},\{0,2\},\{1,2\},\{2,3\}. \end{aligned}$$



В случае HC-модели с двумя состояниями в качестве G имеем (см.[6]-[9]):

$$\textit{свисток}: \{0,0\},\{0,1\}.$$

Будем писать $x < y$, если путь от x^0 до y проходит через x. Вершина y называется прямым потомком x, если $y > x$ и $x,\ y$ являются соседями. Заметим, что в $\Im^k$ всякая вершина $x \neq x^0$ имеет k прямых потомков, а вершина x^0 имеет $k + 1$ потомков.

Для $\sigma_n \in \Omega^G_{V_n}$ положим

$$\#\sigma_n = \sum_{x \in V_n} \mathbf{1}(\sigma_n(x) \geq 1)$$

число занятых вершин в σ_n.

Пусть $z : x \mapsto z_x = (z_{0,x}, z_{1,x}, z_{2,x}, z_{3,x}) \in R_+^4$ ($z : x \mapsto z_x = (z_{0,x}, z_{1,x}) \in R_+^2$ в случае $m = 1$) векторнозначная функция на V. Для $n = 1, 2, \ldots$ и $l > 0$ рассмотрим вероятностную меру $\mu^{(n)}$ на $\Omega_{V_n}^G$, определяемую как

$$\mu^{(n)}(\sigma_n) = \frac{1}{Z_n}\lambda^{\#\sigma_n} \prod_{x\in W_n} z_{\sigma(x),x}. \tag{1}$$

Здесь Z_n-нормирующий делитель:

$$Z_n = \sum_{\widetilde{\sigma}_n\in\Omega_{V_n}^G} \lambda^{\#\widetilde{\sigma}_n} \prod_{x\in W_n} z_{\widetilde{\sigma}(x),x}.$$

Говорят, что вероятностная мера $\mu^{(n)}$ является согласованной, если $\forall\ n \geq 1$ и $\sigma_{n-1} \in \Omega_{V_{n-1}}^G$:

$$\sum_{\omega_n\in\Omega_{W_n}} \mu^{(n)}(\sigma_{n-1} \vee \omega_n)\mathbf{1}(\sigma_{n-1} \vee \omega_n \in \Omega_{V_n}^G) = \mu^{(n-1)}(\sigma_{n-1}). \tag{2}$$

В этом случае существует единственная мера μ на $(\Omega^G, \mathbf{B})$ такая, что для всех n и $\sigma_n \in \Omega_{V_n}^G$

$$\mu(\{\sigma|_{V_n} = \sigma_n\}) = \mu^{(n)}(\sigma_n),$$

где $\mathbf{B}-\sigma$-алгебра, порожденная цилиндрическими подмножествами Ω^G.

Определение 2. Мера μ, определенная формулой (1) с условием согласованности (2), называется (G-)НС-*мерой Гиббса* с $\lambda > 0$, *соответствующей функции* $z : x \in V \setminus \{x^0\} \mapsto z_x$. Множество таких мер (для всевозможных z) обозначается через $\mathcal{S}_G$. При этом НС-мера Гиббса, соответствующая постоянной функции $z_x \equiv z$, называется трансляционно-инвариантной.

3 Слабо периодические меры Гиббса

Гамильтониан НС-модели с двумя состояниями определяется по формуле

$$H(\sigma) = \begin{cases} J\sum\limits_{x\in V} \sigma(x), & \text{если } \sigma \in \Omega, \\ +\infty, & \text{если } \sigma \notin \Omega, \end{cases}$$

где $J \in R$ и $\sigma(x) \in \Phi = \{0, 1\}$.

Пусть $\widehat{G}_k-$ подгруппа группы G_k.

Если гиббсовская мера инвариантна относительно некоторой подгруппы конечного индекса $\widehat{G}_k \subset G_k$, то она называется $\widehat{G}_k$ - периодической.

Известно [6], что каждой мере Гиббса для НС-модели на дереве Кэли можно сопоставлять совокупность величин $z = \{z_x, x \in G_k\}$, удовлетворяющих

$$z_x = \prod_{y\in S(x)} (1 + \lambda z_y)^{-1}, \tag{3}$$

где $\lambda = e^{J_1} > 0-$ параметр, $J_1 = -J\beta$, $\beta = \frac{1}{T}$, $T > 0-$температура.

Определение 3. Совокупность величин $z = \{z_x, x \in G_k\}$ называется $\widehat{G}_k$-периодической, если $z_{yx} = z_x$ для $\forall x \in G_k, y \in \widehat{G}_k$.

G_k- периодические совокупности называются трансляционно-инвариантными.

Для любого $x \in G_k$ множество $\{y \in G_k : \langle x, y\rangle\} \setminus S(x)$ имеет единственный элемент, которого обозначим через $x_\downarrow$ (см.[18],[19]).

Пусть $G_k/\widehat{G}_k = \{H_1, ..., H_r\}$ фактор группа, где $\widehat{G}_k$ нормальный делитель индекса $r \geq 1$.

Определение 4. Совокупность величин $z = \{z_x, x \in G_k\}$ называется $\widehat{G}_k$ - слабо периодической, если $z_x = z_{ij}$ при $x \in H_i, x_\downarrow \in H_j$ для $\forall x \in G_k$.

Заметим, что слабо периодическая совокупность z совпадает с обычной периодической (см. определение 3), если значение z_x не зависит от $x_\downarrow$.

Определение 5. Мера μ называется $\widehat{G}_k$-(слабо) периодической, если она соответствует $\widehat{G}_k$-(слабо) периодической совокупности величин z.

Пусть $A \subset \{1, 2, ..., k+1\}$ и $H_A = \{x \in G_k : \sum\limits_{i \in A} w_x(a_i) -$четное число$\}$, где $w_x(a_i)-$ число буквы a_i в слове $x \in G_k$, ${G_k}^{(2)} = \{x \in G_k :\mid x \mid -$четное число$\}$, где $\mid x \mid -$ длина слова $x \in G_k$ и ${G_k}^{(4)} = H_A \cap {G_k}^{(2)}-$ нормальный делитель индекса 4.

Рассмотрим фактор-группу $G_k/{G_k}^{(4)} = \{H_0, H_1, H_2, H_3\}$, где

$$H_0 = \{x \in G_k : \sum_{i \in A} w_x(a_i) - \text{четно}, |x| - \text{четно}\}$$

$$H_1 = \{x \in G_k : \sum_{i \in A} w_x(a_i) - \text{нечетно}, |x| - \text{четно}\}$$

$$H_2 = \{x \in G_k : \sum_{i \in A} w_x(a_i) - \text{четно}, |x| - \text{нечетно}\}$$

$$H_3 = \{x \in G_k : \sum_{i \in A} w_x(a_i) - \text{нечетно}, |x| - \text{нечетно}\}$$

Тогда в силу (6) $G_k^{(4)}-$ слабо периодическая совокупность величин z_x имеет вид

$$z_x = \begin{cases} z_1, & x \in H_3,\ x_\downarrow \in H_1 \\ z_2, & x \in H_1,\ x_\downarrow \in H_3 \\ z_3, & x \in H_3,\ x_\downarrow \in H_0 \\ z_4, & x \in H_0,\ x_\downarrow \in H_3 \\ z_5, & x \in H_1,\ x_\downarrow \in H_2 \\ z_6, & x \in H_2,\ x_\downarrow \in H_1 \\ z_7, & x \in H_2,\ x_\downarrow \in H_0 \\ z_8, & x \in H_0,\ x_\downarrow \in H_2, \end{cases}$$

где z_x удовлетворяет системе уравнений

$$\begin{cases} z_1 = \frac{1}{(1+\lambda z_4)^i} \cdot \frac{1}{(1+\lambda z_2)^{k-i}} \\ z_2 = \frac{1}{(1+\lambda z_6)^i} \cdot \frac{1}{(1+\lambda z_1)^{k-i}} \\ z_3 = \frac{1}{(1+\lambda z_4)^{i-1}} \cdot \frac{1}{(1+\lambda z_2)^{k-i+1}} \\ z_4 = \frac{1}{(1+\lambda z_3)^{i-1}} \cdot \frac{1}{(1+\lambda z_7)^{k-i+1}} \\ z_5 = \frac{1}{(1+\lambda z_6)^{i-1}} \cdot \frac{1}{(1+\lambda z_1)^{k-i+1}} \\ z_6 = \frac{1}{(1+\lambda z_5)^{i-1}} \cdot \frac{1}{(1+\lambda z_8)^{k-i+1}} \\ z_7 = \frac{1}{(1+\lambda z_5)^i} \cdot \frac{1}{(1+\lambda z_8)^{k-i}} \\ z_8 = \frac{1}{(1+\lambda z_3)^i} \cdot \frac{1}{(1+\lambda z_7)^{k-i}}. \end{cases} \tag{4}$$

Здесь $i = |A|-$мощность множества A. Из системы уравнений (4) можно получить следующую систему уравнений (см. [9])

$$\begin{cases} z_1 = \frac{(1+\lambda z_7)^k}{((1+\lambda z_7)^{k/i}+\lambda z_8^{1-1/i})^i} \cdot \frac{1}{(1+\lambda z_2)^{k-i}} \\ z_2 = \frac{(1+\lambda z_8)^k}{((1+\lambda z_8)^{k/i}+\lambda z_7^{1-1/i})^i} \cdot \frac{1}{(1+\lambda z_1)^{k-i}} \\ z_7 = \frac{(1+\lambda z_1)^k}{((1+\lambda z_1)^{k/i}+\lambda z_2^{1-1/i})^i} \cdot \frac{1}{(1+\lambda z_8)^{k-i}} \\ z_8 = \frac{(1+\lambda z_2)^k}{((1+\lambda z_2)^{k/i}+\lambda z_1^{1-1/i})^i} \cdot \frac{1}{(1+\lambda z_7)^{k-i}} \end{cases} \tag{5}$$

Из работы [9] известно, что множество $I_2 = \{(z_1, z_2, z_7, z_8) \in R^4 : z_1 = z_7,\ z_2 = z_8\}$, является инвариантным относительно отображения $W : R^4 \to R^4$, определенным следующим образом:

$$\begin{cases} z_1' = \frac{(1+\lambda z_7)^k}{((1+\lambda z_7)^{k/i}+\lambda z_8^{1-1/i})^i} \cdot \frac{1}{(1+\lambda z_2)^{k-i}} \\ z_2' = \frac{(1+\lambda z_8)^k}{((1+\lambda z_8)^{k/i}+\lambda z_7^{1-1/i})^i} \cdot \frac{1}{(1+\lambda z_1)^{k-i}} \\ z_7' = \frac{(1+\lambda z_1)^k}{((1+\lambda z_1)^{k/i}+\lambda z_2^{1-1/i})^i} \cdot \frac{1}{(1+\lambda z_8)^{k-i}} \\ z_8' = \frac{(1+\lambda z_2)^k}{((1+\lambda z_2)^{k/i}+\lambda z_1^{1-1/i})^i} \cdot \frac{1}{(1+\lambda z_7)^{k-i}} \end{cases}$$

Кроме того, в [9] (см.Лемма 2) было доказано, что если на I_2 существуют слабо периодические меры Гиббса, то они являются либо трансляционно-инвариантными, либо слабо периодическими(не периодическими).

Перепишем систему (5) на I_2 при $k = 2, i = 1$

$$\begin{cases} z_1 = \frac{(1+\lambda z_1)^2}{(1+\lambda z_1)^2+\lambda} \cdot \frac{1}{1+\lambda z_2} \\ z_2 = \frac{(1+\lambda z_2)^2}{(1+\lambda z_2)^2+\lambda} \cdot \frac{1}{1+\lambda z_1} \end{cases}$$

После обозначений $x = 1+\lambda z_1 > 1$ и $y = 1+\lambda z_2 > 1$ из последней системы уравнений имеем

$$\begin{cases} x = f(y) \\ y = f(x), \end{cases}$$

где $f(x) = \frac{\lambda x^2}{(x^2+\lambda)(x-1)}$. Уравнение $f(x) = x$ имеет единственное положительное решение при любых $\lambda > 0$, т.к. уравнение

$$x = \frac{\lambda x^2}{(x^2+\lambda)(x-1)} = f(x)$$

эквивалентно уравнению $x^3 - x^2 - \lambda = 0$, которое по теореме Декарта о количестве положительных корней многочлена имеет не более одного положительного решения и

$$f(1) = -\lambda, \ \lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty.$$

Очевидно, что это решение больше единицы. Кроме того, оно находится среди решений уравнения $f(f(x)) = x$. Поэтому рассмотрим уравнение

$$\frac{x - f(f(x))}{x - f(x)} = 0,$$

которое эквивалентно уравнению

$$h(x) = x^6 - (\lambda+2)x^5 + (5\lambda+1)x^4 - \lambda(2\lambda+5)x^3 + 2\lambda(2\lambda+1)x^2 - 3\lambda^2 x + \lambda^2 = 0.$$

Из этого уравнения имеем $h(1) = \lambda > 0$ и $h(x) \to +\infty$ при $x \to +\infty$. Кроме того, график функции $h(x)$ касается оси Ox при $x = 2, \lambda = 4$, т.к. $h(2) = -(\lambda-4)(5\lambda+4)$. Отсюда уравнение $h(x) = 0$ не имеет решений при $\lambda < 4$, имеет одно решение при $\lambda = 4$ и имеет по крайней мере два решения при $\lambda > 4$.



Рис. 1. График функции $\psi(x)$ при $x > 1$ (слева). График функции $\varphi(x)$ при $x > 1$ (справа).

Покажем, что уравнение $h(x) = 0$ при $\lambda > 4$ имеет ровно два решения. Оно имеет решение $x = x(\lambda)$. Но мы рассмотрим это уравнение относительно переменнной λ, т.е.

$$-(x-1)(2x^2-2x+1)\lambda^2 - x^2(x^3-5x^2+5x-2)\lambda + x^4(x-1)^2 = 0$$

и получим решения вида

$$\lambda_{1_2} = \frac{x^2(x^3-5x^2+5x-2) \pm x^3\sqrt{x^4-2x^3+3x^2-2x+1}}{-2(x-1)(2x^2-2x+1)}.$$

Очевидно, что $\lambda_1 < 0$ и $\lambda_2 > 0$. Отсюда рассмотрим

$$\lambda = \lambda_2 = \frac{x^2(x^3 - 5x^2 + 5x - 2) - x^3\sqrt{x^4 - 2x^3 + 3x^2 - 2x + 1}}{-2(x-1)(2x^2 - 2x + 1)} = \varphi(x).$$

Рассмотрим уравнение

$$\varphi^{'}(x) = \frac{g_1(x) + g_2(x)\sqrt{D}}{g_3(x)\sqrt{D}} = 0,$$

где

$$g_1(x) = 2x^5(4x^7 - 18x^6 + 38x^5 - 52x^4 + 48x^3 - 31x^2 + 13x - 3),$$

$$g_2(x) = -2x(4x^6 - 22x^5 + 52x^4 - 66x^3 + 50x^2 - 21x + 4),$$

$$g_3(x) = 4(2x^3 - 4x^2 + 3x - 1)^2,\ D = x^6(x^4 - 2x^3 + 3x^2 - 2x + 1).$$

Оно эквивалентно уравнению $(x-1)^3\psi(x) = 0$, где $\psi(x) = 64x^{12} - 480x^{11} + 1760x^{10} - 4224x^9 + 7312x^8 - 9592x^7 + 9736x^6 - 7696x^5 + 4696x^4 - 2160x^3 + 712x^2 - 152x + 16$. С помощью программы MapLE можно увидеть, что уравнение $\psi(x) = 0$ имеет один вещественный корень $x_0 = 2$ при $x > 1$ (Рис.1, слева), т.е. функция $\varphi(x)$ при $x > 1$ имеет одну критическую точку $x_0 = 2$. Кроме того, $\varphi(x) \to +\infty$ при $x \to 1$ и $x \to +\infty$. Следовательно, функция $\varphi(x)$ убывает при $1 < x < 2 = x_{min}$ и возрастает при $x > 2$ (Рис.1, справа). Из всего сказанного следует, что каждому значению λ соответствуют только два значения x при $\lambda > \lambda_{cr}$, где $\lambda_{cr} = \varphi(2) = 4$.

Итак, справедлива следующая

Теорема 1. *Пусть $k = 2, i = 1, \lambda_{cr} = 4$. Тогда для HC-модели в случае нормального делителя индекса четыре на I_2 при $\lambda < \lambda_{cr}$ существует одна слабо периодическая мера Гиббса, которая является трансляционно-инвариантной, при $\lambda = \lambda_{cr}$ существуют две слабо периодические меры Гибсса, одна из которых является трансляционно-инвариантной, другая слабо периодической (не периодической) и при $\lambda > \lambda_{cr}$ существуют ровно три слабо периодические меры Гибсса, одна из которых является трансляционно-инвариантной, остальные две слабо периодическими (не периодическими).*

Замечание 1. В работе [9] было доказано, что при $\lambda > \lambda_{cr}$ существуют не менее двух слабо периодических (не периодических) мер Гибсса.

4 Трансляционно-инвариантные меры Гиббса

Пусть $L(G)$-множество ребер графа G, обозначим через $A \equiv A^G = \left(a_{ij}\right)_{i,j=0,1,2,3}$ матрицу смежности G, т.е.

$$a_{ij} \equiv a_{ij}^G = \begin{cases} 1, & \text{если } \{i,j\} \in L(G), \\ 0, & \text{если } \{i,j\} \notin L(G). \end{cases} \tag{6}$$

В следующей теореме сформулировано условие на z_x, гарантирующее согласованность меры $\mu^{(n)}$.

Теорема 2.[4] Вероятностные меры $\mu^{(n)}$, $n = 1, 2, \ldots$, заданные формулой (1), согласованны тогда и только тогда, когда для любого $x \in V$ имеют место следующие равенства:

$$z'_{0,x} = \lambda \prod_{y \in S(x)} \frac{a_{00}z'_{0,y} + a_{01}z'_{1,y} + a_{02}z'_{2,y} + a_{03}}{a_{30}z'_{0,y} + a_{31}z'_{1,y} + a_{32}z'_{2,y} + a_{33}},$$

$$z'_{1,x} = \lambda \prod_{y\in S(x)} \frac{a_{10}z'_{0,y} + a_{11}z'_{1,y} + a_{12}z'_{2,y} + a_{13}}{a_{30}z'_{0,y} + a_{31}z'_{1,y} + a_{32}z'_{2,y} + a_{33}},$$

$$z'_{2,x} = \lambda \prod_{y\in S(x)} \frac{a_{20}z'_{0,y} + a_{21}z'_{1,y} + a_{22}z'_{2,y} + a_{23}}{a_{30}z'_{0,y} + a_{31}z'_{1,y} + a_{32}z'_{2,y} + a_{33}},$$

где $z'_{i,x} = \lambda z_{i,x}/z_{3,x}, \quad i = 0, 1, 2.$

Мы полагаем, что $z_{3,x} \equiv 1$ и $z_{i,x} = z'_{i,x} > 0, \quad i = 0, 1, 2$. Тогда для любых функций $x \in V \mapsto z_x = (z_{0,x}, z_{1,x}, z_{2,x})$, удовлетворяющих равенству

$$z_{i,x} = \lambda \prod_{y\in S(x)} \frac{a_{i0}z_{0,y} + a_{i1}z_{1,y} + a_{i2}z_{2,y} + a_{i3}}{a_{30}z_{0,y} + a_{31}z_{1,y} + a_{32}z_{2,y} + a_{33}}, \quad i = 0, 1, 2, \tag{7}$$

существует единственная G-НС-мера Гиббса μ и наоборот. Рассмотрим трансляционно-инвариантные решения, в которых $z_x = z \in R^3_+$, $x \neq x_0$. В случаях $G =$ *палка* и $G =$ *ключ* из (7) получим следующие системы уравнений:

$$\begin{cases} z_0 = \lambda \left(\frac{z_1}{z_2}\right)^k, \\ z_1 = \lambda \left(\frac{z_0+z_2}{z_2}\right)^k, \\ z_2 = \lambda \left(\frac{z_1+1}{z_2}\right)^k, \end{cases} \tag{8}$$

$$\begin{cases} z_0 = \lambda \left(\frac{z_1+z_2}{z_2}\right)^k, \\ z_1 = \lambda \left(\frac{z_0+z_2}{z_2}\right)^k, \\ z_2 = \lambda \left(\frac{z_0+z_1+1}{z_2}\right)^k, \end{cases} \tag{9}$$

соответственно.

Лемма. ([15]) *В системе уравнений (9)* $z_0 = z_1$.

4.1 Случай $G =$ *палка*

В случае $G =$ *палка* из третьего уравнения системы (8) найдем z_2 и подставим в первое уравнение. Полученные выражения для z_2 и z_0 подставим во второе уравнение. В результате получим уравнение ($z = z_1$)

$$z = \lambda \cdot \left(\frac{z^k}{(z+1)^k} + 1\right)^k = f(z). \tag{10}$$

Из уравнения (10) найдем λ

$$\lambda = \varphi(z) = \frac{z}{\left(\frac{z^k}{(z+1)^k} + 1\right)^k}. \tag{11}$$

Замечание 2. 1. В работе [15] при $k = 2$ и $\lambda > 0$ было доказано, что существует только одна трансляционно-инвариантная мера Гиббса.

2. В работе [16] при $k = 3$, $k = 4$ и $\lambda > 0$ было доказано, что существует только одна трансляционно-инвариантная мера Гиббса, а при $k = 5$ были найдены приближенные

значения для $\lambda_{cr}^{(1)} \approx 0.8800478543,\ \lambda_{cr}^{(2)} \approx 1.078094055$ такие, что при $\lambda < \lambda_{cr}^{(1)}$ и $\lambda > \lambda_{cr}^{(2)}$ существует только одна трансляционно-инвариантная мера Гиббса, при $\lambda = \lambda_{cr}^{(1)}$ или $\lambda = \lambda_{cr}^{(2)}$ существуют ровно две трансляционно-инвариантные меры Гиббса и при $\lambda_{cr}^{(1)} < \lambda < \lambda_{cr}^{(2)}$ существуют ровно три трансляционно-инвариантные меры Гиббса.

Следующая теорема является обобщением Теоремы 2 из [16]:

Теорема 3. *Пусть $k \geq 5$. Тогда в случае G = палка для Hard-Core модели существуют $\lambda_{cr}^{(1)} = \varphi(z_2),\ \lambda_{cr}^{(2)} = \varphi(z_1)$ такие, что при $\lambda < \lambda_{cr}^{(1)}$ и $\lambda > \lambda_{cr}^{(2)}$ существует только одна трансляционно-инвариантная мера Гиббса, при $\lambda = \lambda_{cr}^{(1)}$ или $\lambda = \lambda_{cr}^{(2)}$ существуют две трансляционно-инвариантные меры Гиббса и при $\lambda_{cr}^{(1)} < \lambda < \lambda_{cr}^{(2)}$ существуют только три трансляционно-инвариантные меры Гиббса, где $z_1,\ z_2-$точки максимума и минимума функции $\varphi(z)$, соответственно.*

Доказательство. Рассмотрим (11) при $k \geq 5$. Проанализируя функцию $\varphi(z)$, заметим, что $\varphi(z) > 0,\ \varphi(0) = 0$ и $\varphi(z) \to +\infty$ при $z \to +\infty$. Ее производная имеет вид

$$\varphi'(z) = \frac{(z+1)^{k^2-1}[z^{k+1} + (1+z)^{k+1} + z^k - k^2 z^k]}{[z^k + (z+1)^k]^{k+1}}.$$

По теореме Декарта многочлен $h(z) = z^{k+1} + (1+z)^{k+1} + z^k - k^2 z^k$ имеет не более двух положительных корня. Очевидно, что $h(0) = 1$ и $h(z) \to +\infty$ при $z \to +\infty$. Кроме того, $h(k+1) < 0$ (Рис.2, слева). Следовательно, многочлен $h(z)$ имеет ровно два корня $z_1,\ z_2$, т.е. для функции $\varphi(z)$ существуют две критические точки. Тогда функция $\varphi(z)$ возрастает при $0 < z < z_1$ и $z > z_2$, убывает при $z_1 < z < z_2$ (Рис.2, справа). Отсюда $z_1 = z_{max},\ z_2 = z_{min}$. А это значит, что каждому значению $\lambda > 0$ соответствует только одно значение z при $\lambda < \varphi(z_2) = \lambda_{cr}^{(1)}$ и $\lambda > \varphi(z_1) = \lambda_{cr}^{(2)}$, два значения при $\lambda = \lambda_{cr}^{(1)}$ или $\lambda = \lambda_{cr}^{(2)}$ и ровно три значения при $\lambda_{cr}^{(1)} < \lambda < \lambda_{cr}^{(2)}$. Теорема доказана.



Рис. 2. Графики функций $h(k+1)$ (слева) и $\varphi(z)$ при $k = 6$ (справа).

Замечание 3. Воспользуясь Теоремой 3, можно найти $\lambda_{cr}^{(1)} \approx 0.6655887267,\ \lambda_{cr}^{(2)} \approx 1.207665883$ при $k = 6$ и $\lambda_{cr}^{(1)} \approx 0.4661975987,\ \lambda_{cr}^{(2)} \approx 1.34764746$ при $k = 7$.

4.2 Случай $G =$ *ключ*

Из (9) можем получить ($z = z_1$)

$$z = \lambda \cdot \left(\frac{z}{\sqrt[k+1]{\lambda(2z+1)^k}} + 1 \right)^k = f(z),$$

производная правой части которого равна

$$f'(z) = k\lambda \left(\frac{z}{\sqrt[k+1]{\lambda(2z+1)^k}} + 1 \right)^{k-1} \frac{2z+k+1}{\sqrt[k+1]{\lambda(2z+1)^{2k+1}}}.$$

Легко показать, что уравнение $z = f(z)$ имеет более одного решения тогда и только тогда, когда уравнение $zf'(z) = f(z)$ имеет более одного решения. Поэтому рассмотрим уравнение $zf'(z) = f(z)$, которое эквивалентно уравнению

$$\lambda = \frac{z^{k+1}[2(k-1)z + k^2 + k - 1]^{k+1}}{(2z+1)^{2k+1}} = \varphi_1(z).$$

Ясно, что $\varphi_1(0) = 0$ и $\varphi_1(z) \to +\infty$ при $z \to +\infty$. Вычислим производную

$$\varphi_1'(z) = \frac{z^k \cdot \left[2(k-1)z + k^2 + k - 1\right]^k \cdot \left[4(k-1)z^2 - 2(k^3 - k^2 - k + 2)z + (k-1)(k^2 + k - 1)\right]}{(2z+1)^{2k+2}}.$$

Функция $\varphi_1(z)$ строго возрастает, если дискриминант $D(k) = 4k^2(k^4 - 2k^3 - 5k^2 + 2k + 5)$ квадратного трехчлена $4(k-1)z^2 - 2(k^3 - k^2 - k + 2)z + (k-1)(k^2 + k - 1)$ отрицательный. Можно увидеть, что $D < 0$ при $k = 2$ и $k = 3$. Значит, в этих случаях каждому значению λ соответствует только одно значение z. Следовательно, уравнение $z = f(z)$ имеет не более одного решения при $k = 2,\ k = 3,\ \lambda > 0$.



Рис. 3. График функции $\varphi_1(z)$ при $k = 4$.

Можно показать, что $D > 0$ при $k \geq 4$. Тогда анализ функции $\varphi_1(z)$ показывает, что она строго возрастает при $z < z_2,\ z > z_1$ и убывает при $z_2 < z < z_1$, где z_1, z_2 ($z_1 > z_2 > 0$) точки экстремума функции $\varphi_1(z)$ (Рис.3):

$$z_{1,2} = \frac{k^3 - k^2 - k + 2 \pm k\sqrt{k^4 - 2k^3 - 5k^2 + 2k + 5}}{4(k-1)}.$$

Следовательно, уравнение $zf^{'}(z) = f(z)$ (соответственно, и уравнение $z = f(z)$) имеет одно решение при $\lambda > \lambda_{cr}^{(2)}$, $\lambda < \lambda_{cr}^{(1)}$ и имеет более одного решения при $\lambda_{cr}^{(1)} \leq \lambda \leq \lambda_{cr}^{(2)}$, где

$$\lambda_{cr}^{(1)} = \varphi_1(z_1) = \left(\frac{k-1}{2k}\right)^k \cdot \frac{\left[(k^3-k^2-k+2+k\sqrt{D_1})\cdot(k^2+k+1+\sqrt{D_1})\right]^{k+1}}{4\left(k^2-k+1+\sqrt{D_1}\right)^{2k+1}}, \qquad (12)$$

$$\lambda_{cr}^{(2)} = \varphi_1(z_2) = \left(\frac{k-1}{2k}\right)^k \cdot \frac{\left[(k^3-k^2-k+2-k\sqrt{D_1})\cdot(k^2+k+1-\sqrt{D_1})\right]^{k+1}}{4\left(k^2-k+1-\sqrt{D_1}\right)^{2k+1}}. \qquad (13)$$

Здесь $D_1 = k^4 - 2k^3 - 5k^2 + 2k + 5$. Отсюда верна следующая

Теорема 4. *Пусть $k \geq 4$. Тогда в случае $G =$ ключ для Hard-Core модели существуют $\lambda_{cr}^{(1)}$, $\lambda_{cr}^{(2)}$, определенные формулами (12) и (13), такие, что при $\lambda < \lambda_{cr}^{(1)}$ и $\lambda > \lambda_{cr}^{(2)}$ существует только одна трансляционно-инвариантная мера Гиббса, при $\lambda_{cr}^{(1)} \leq \lambda \leq \lambda_{cr}^{(2)}$ существуют более одной трансляционно-инвариантной меры Гиббса.*

Замечание 4. Заметим, что в работе [15] при $k = 2$ и в работе [16] при $k = 3$ было доказано, что в случае $G =$ *ключ* для любых $\lambda > 0$ существует только одна Hard-Core трансляционно-инвариантная мера Гиббса.

Список литературы

[1] *Георги Х.-О.* Гиббсовские меры и фазовые переходы. Москва. "Мир"1992.

[2] *Preston C. J.* Gibbs States on Countable Sets. Cambridge Tracts Math., 68, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1974.

[3] *Синай Я. Г.* Теория фазовых переходов. Строгие результаты. Наука, М., 1980.

[4] *U.A. Rozikov.* Gibbs measures on Cayley trees. World Scientific.-2013.

[5] *A.E. Mazel, Yu.M. Suhov,* Random surfaces with two-sided constraints: an application of the theory of dominant ground states // J. Statist. Phys., **64** (1991), 111–134.

[6] *Suhov Yu.M., Rozikov U.A.* A hard-core model on a Cayley tree: an example of a loss network // Queueing Systems, **46** (2004), 197-212.

[7] *Розиков У.А., Хакимов Р.М.* Условие единственности слабопериодической гиббсовской меры для модели жесткой сердцевины // Теор. и мат. физика, **173**:1 (2012), 60-70.

[8] *Хакимов Р.М.* Единственность слабо периодической гиббсовской меры для HC-модели // Математические заметки. 2013, т. 94, No 5, с.796-800.

[9] *Хакимов Р.М.* Слабо периодические меры Гиббса для HC-модели для нормального делителя индекса четыре // arXiv: 1409.7005v1 [math-ph], Принята в Украинский математический журнал.

[10] *Martin J.B., Rozikov U.A., Suhov Yu.M.* A three state hard-core model on a Cayley tree // J. Nonlin. Math. Phys., **12**: 3 (2005), 432-448.

[11] *Розиков У.А., Шоюсупов Ш.А.* Плодородные НС-модели с тремя состояниями на дереве Кэли // Теор. и мат. физика, **156**:3 (2008), 412-424.

[12] *Хакимов Р.М.* Трансляционно-инвариантные меры Гиббса для плодородных НС-моделей с тремя состояниями на дереве Кэли // Теор. и мат. физика, **183**:3 (2015), 441-449.

[13] *Rozikov U.A., Khakimov R.M.* Gibbs measures for the fertile three-state hard core models on a Cayley tree // Queueing Systems, V.81, No.1, (2015), 49-69.

[14] *Brightwell G., Winkler P.* Graph homomorphisms and phase transitions // J.Combin. Theory Ser. B, **75** (1999), 221-262.

[15] *Khakimov R.M.* The uniqueness of the translation-invariant Gibbs measure for four state HC-models on a Cayley tree // Journal of Siberian Federal University. Mathematics and Phisics. 2015, 8(2), p.165-172.

[16] *Хакимов Р.М.* Меры Гиббса для плодородных моделей жесткой сердцевины на дереве Кэли // Принята в Теор. и мат. физика. DOI: 10.4213/tmf8886.

[17] *Ганиходжаев Н.Н., Розиков У.А.* Описание периодических крайних гиббсовских мер некоторых решеточных моделей на дереве Кэли // ТМФ, **111**: 1 (1997), 109-117.

[18] *Zachary S.* Countable state space Markov random fields and Markov chains on trees // Ann. Probab., **11** (1983), 894-903.

[19] *Розиков У.А., Рахматуллаев М.М.* Описание слабо периодических мер Гиббса модели Изинга на дереве Кэли // Теор. и мат. физика, **156**: 2 (2008), 292-302.